

इरेसिड कसरी: परिवर्तन गर्ने

1

सबै आवश्यक सामग्रीहरू जम्मा गर्नुहोस्

- घाउ हेरचाह कार्ट र क्याङ्डीहरू बिरामी/निवासीको स्याहार क्षेत्रमा लैजानु हुँदैन ।
- धेरै घाउ छ भने संक्रमण रोक्नका लागि हरेक घाउको लागि छुट्टै सफा सामग्रीहरू राख्नुहोस् ।
- धेरै डोज भएका औषधिहरू कसैलाई दिनुपर्छ र एउटा बिरामी/निवासीलाई प्रयोग गर्नका लागि थोरै औषधि सफा कन्टेनरमा राख्नुपर्छ ।

2

हात धुनुहोस्

3

सफा क्षेत्र तयार पार्नुहोस्

4

मानक वा प्रसारणमा आधारित सावधानीहरू अनुसार PPE लगाउनुहोस्

5

आवश्यक भएमा घाउको मुनि एउटा केही कुरा राख्नुहोस्

6

पुरानो इरेसिड तुरुन्तै निकालेर फ्याँक्नुहोस्

7

फोहोर पञ्जाहरू निकालेर हात धुनुहोस्

8

सफा पञ्जाहरू लगाइयो

9

एसेप्टिक प्रविधि प्रयोग गरेर घाउ सफा गर्नुहोस्

10

कुनै पनि घाउको उपचार आफ्नो प्रदायकका आदेशअनुसार गर्नुहोस्

- धेरै घाउहरू छन् भने सफादेखि फोहोर घाउ गर्दै 2-10 चरण दोहोयाउनुहोस् ।

11

प्रयोग गरिएका सबै सामग्री फाल्नुहोस्, प्रयोग नगरिएका सामग्रीहरू कि त फाल्नुपर्छ कि कसैलाई दिनुपर्छ

12

पञ्जाहरू निकालेर हात धुनुहोस्

13

फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने उपकरण सफा गरेर कीटाणुमुक्त बनाइयो