


Prácticas recomendadas de IPC durante el cuidado de una herida



Durante los procedimientos de cuidado de una herida se deben implementar las precauciones estándares:

Higienización de manos

- Antes y después del cuidado de una herida, incluso si se usaron guantes.
- Después de retirar el equipo de protección personal, incluso si se cambian los guantes durante el procedimiento.
- Cuando se pasa de una tarea contaminada a una limpia.

Elección correcta del equipo de protección personal

- Elección correcta del equipo de protección personal
- Se deben usar batas quirúrgicas cuando el cuidado de una herida implica contacto significativo con el paciente o el interno o su entorno inmediato.
- Se deben usar gafas de protección y una mascarilla o protector facial durante los procedimientos de cuidado de una herida que podrían producir salpicaduras o pulverizaciones.

Manipulación correcta del material usado para el cuidado de una herida, incluidos los medicamentos

- El organizador o el carrito con material limpio nunca debe ingresar en la habitación del paciente o del interno.
- El material en el organizador o el carrito solo debe manipularse con las manos limpias.
- El material debe colocarse sobre una superficie limpia.
- Mantenga una separación entre el material limpio y el contaminado.
 - Si existen varias heridas, cada una debe contar con sus propio material para el cambio de vendaje y se debe empezar a cambiar el vendaje de la herida más limpia a la más contaminada.
- El material sin usar no debe volverse a guardar en el organizador o el carrito, sino que debe descartarse o destinarse a un solo paciente.
- Los pulverizadores o los envases de medicamentos, como las cremas o los ungüentos, deben ser exclusivos de una persona, siempre que sea posible.
 - Se debe destinar una pequeña cantidad de medicamento para usarse en un solo paciente o interno antes del procedimiento.
 - El resto del envase de varias dosis debe almacenarse de manera correcta en una zona limpia exclusiva.
- Los envases que ingresen en las zonas de cuidado de un paciente o interno deben destinarse de manera exclusiva para esa persona.

Limpieza y desinfección de lo siguiente:

- Las superficies del entorno y el equipamiento reutilizable para el cuidado de una herida pueden actuar como fuentes de transmisión de microorganismos patógenos si no se limpian y desinfectan correctamente.
- El equipamiento reutilizable para el cuidado de una herida debe limpiarse y desinfectarse después de cada uso.
- Toda superficie de la zona de tratamiento que podría haberse contaminado durante el cuidado de la herida debe limpiarse y desinfectarse de inmediato después del procedimiento.